

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

ТОНЗИЛОТРЕН / Tonsilotren

Торговое название препарата

Тонзилотрен

Лекарственная форма

таблетки для рассасывания

Состав на 1 таблетку:

Активные компоненты: Atropinum sulfuricum (атропинум сульфурикум) D5 - 12,5 мг; Hepar sulfuris (Hepar sulfuris calcareum) (гепар сульфурис) D3 - 10 мг; Kalium bichromicum (калиум бихромикум) D4 - 50 мг; Acidum silicicum (Silicea) (силицеа) D2 - 5 мг; Hydrargyrum bijodatum (Mercurius bijodatus) (гидрагирум бииодатум) D8 - 25 мг;

вспомогательные компоненты: лактозы моногидрат – 122,5 мг, сахароза – 24 мг, магния стеарат – 1 мг.

Описание

Таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской, белого цвета, иногда с одиночными вкраплениями темно-серого цвета, без запаха или с легким сернистым запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Гомеопатическое средство.

Фармакологическое действие

Многокомпонентный гомеопатический препарат, действие которого обусловлено активными компонентами, входящими в его состав.

Показания к применению

Острая катаральная, лакунарная или фолликулярная ангина, хронический тонзиллит, ускорение заживления слизистой оболочки глотки после удаления миндалин (в комплексной терапии).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к хрому или другим компонентам препарата, недостаточность лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция. Не рекомендуется применять препарат детям до 3 лет по причине недостаточности клинических данных.

С осторожностью

При гипертиреозе

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Во время беременности и в период лактации применять только в том случае, если ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и/или ребенка.

Способ применения и дозы

Принимать за полчаса до еды или через полчаса после еды, медленно рассасывая таблетки в полости рта. Детям от 3 до 5 лет рекомендуется для удобства применения растворять таблетку в небольшом количестве жидкости или давать в измельченном виде, под язык.

При остром течении заболевания детям от 3 до 12 лет – по 1 таблетке каждые 2 часа в течение 1-2 дней (не более 8 раз в день) до наступления улучшения, далее по 1 таблетке 3 раза в день до полного выздоровления;

детям старше 12 лет и взрослым – по 1 таблетке каждый час в течение 1-2 дней (не более 12 раз в день) до наступления улучшения, далее по 1-2 таблетки 3 раза в день до полного выздоровления.

При хроническом тонзиллите детям от 3 до 12 лет принимать по 1 таблетке 3 раза в день; детям старше 12 лет и взрослым принимать по 1-2 таблетки 3 раза в день в течение 6-8 недель.

Рекомендуется проводить повторные курсы лечения (несколько раз в год) после консультации с врачом.

Побочное действие

Возможно повышенное слюноотделение. В этом случае необходимо уменьшить дозу или прекратить прием препарата. При аллергических реакциях со стороны кожных покровов (зуд, высыпания), которые могут возникать в единичных случаях, следует отказаться от приема препарата.

Передозировка

Случаи передозировки не зарегистрированы.



Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Применение гомеопатических препаратов не исключает использование других лекарственных средств.

Особые указания

При гипертриеозе не применять препарат без консультации с врачом.

Информация для больных сахарным диабетом: содержание углеводов в максимальной суточной дозе препарата (12 таблеток) соответствует 0,25 хлебной единицы (ХЕ).

При применении гомеопатических препаратов возможно возникновение временного первичного ухудшения. В этом случае следует прекратить прием препарата и проконсультироваться с врачом.

В случае отсутствия улучшения при остром заболевании в течение первых двух дней препарат следует отменить и обратиться к врачу.

Влияние лекарственного препарата на способность управлять транспортными средствами, работа с движущимися механизмами

Препарат не оказывает влияния на способность к занятию потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе, управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Таблетки для рассасывания. По 20 таблеток в блистере из пленки ПВХ и фольги алюминиевой. По 3 блистера вместе с инструкцией по применению помещают в картонную пачку.

Условия хранения

При температуре от 15 до 25 °C, в сухом месте.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

5 лет.

Не применять препарат по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек

Без рецепта.

Предприятие - производитель

Дойче Хомеопати-Унион

ДХУ-Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ,
Оттоштрассе 24
76227 Карлсруэ, Германия

Deutsche Homoeopathie-Union

DHU-Arzneimittel GmbH & Co. KG
Ottostrasse 24
76227 Karlsruhe Germany
tel. +49 / 721 / 40 93 236

Произведено:

Доктор Вильмар Швабе ГмбХ & Ко. КГ,
Германия, Карлсруэ, 76227
Вильмар Швабе Штрассе, 4.

Представительство в России / Организация, принимающая претензии потребителей

117513 Москва, ул.Островитянова, д.6

тел.: (495) 225-71-21

/ Руководитель отдела регистрации ЛС

Представительства фирмы «Дойче Хомеопати-Унион
ДХУ – Арцнаймиттель ГмбХ & Ко. КГ.»

Н.В. Алеутдинова

